

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17-3-69 903304

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE,  
LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture  
Chemin d'Artiques, 33 - CENON

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

25 F.

Supplément N° 1 au Bulletin Technique N° 102 de Mars 1969

1969-4

## AVERTISSEMENTS

### - ARBRES FRUITIERS -

Tavelure du Poirier - Le temps frais de la dernière décade a retardé la végétation des Poiriers, mais elle risque de devenir très rapide à la suite du relèvement de la température.

Les variétés précoces, notamment dans les Landes, vont débourrer prochainement. En outre, les premiers Périthèces viennent d'arriver à maturité.

Des contaminations primaires peuvent donc se produire par les conidies des chancres des rameaux et par les premiers Périthèces mûrs sur les arbres en voie de débourrement.

Un premier traitement devrait donc être appliqué dès à présent, de préférence avec une Bouillie bordelaise à 1% ou une spécialité cuprique, sur les variétés dont le débourrement est en cours.

Dans les vergers très atteints en 1968, les risques d'invasions par les Ascospores peuvent être réduits, aussi bien pour les Poiriers que pour les Pommiers si on applique des colorants nitrés à 1% sur les feuilles mortes restées sur le sol au pied des arbres.

## INFORMATIONS

Cloque du Prunier - (maladie des pochettes) : Un traitement effectué entre le débourrement et le stade du bouton blanc avec une spécialité organique ou organo-cuprique préviendra les attaques de Cloque.

Cloque du Pêcher - Nous rappelons que pour lutter contre la Cloque du Pêcher il convient de traiter, pour chaque variété, au gonflement du bourgeon. Dans les vergers non traités à cette date, si on peut encore employer le Cuivre à 500 grs de Cuivre métal par hectolitre sur les variétés non débourrées, les produits organiques de synthèse seuls sont utilisables dans les autres plantations (Captane 250 grs M.A./Hl., Ferbame 175 grs M.A./Hl., Thirame 175 grs M.A./Hl., Zirame 175 grs M.A./Hl.).

### - VIGNE -

Si les traitements d'hiver conseillés dans notre Bulletin Technique N° 101 de Février 1969 n'ont pas été appliqués, il est encore temps d'intervenir notamment contre l'Esca, l'Excoriose, l'Erinose, l'Acariose, Le Phylloxéra gallicole et la Cochenille floconneuse.

.../...

P 330

.../...

- COLZA -

Charançon de la tige - On estime généralement qu'un traitement est à envisager uniquement dans les régions où des dégâts importants (environ 50% des tiges attaquées) ont été observés au cours des années précédentes, la date étant ensuite déterminée par les piégeages des adultes au printemps et le stade de développement de la plante.

Le Colza est particulièrement sensible au début de la montaison et jusqu'à ce que la tige ait de 10 à 15 cm de hauteur.

Le stade du début de la montaison est maintenant atteint dans de nombreuses parcelles et le sera dans les prochains jours dans la plupart des autres.

En conséquence, un traitement est à prévoir dès à présent dans les quelques rares cultures au stade sensible où des captures de Charançons sont effectuées depuis le début du mois sur les panneaux englués placés à cet effet au niveau de la végétation (Charente, Charente-maritime, région d'Issigeac).

ATTENTION - Cette note est la dernière que recevront les personnes non réabonnées pour 1969 .

Bordeaux, le 12 Mars 1969

Le Contrôleur  
chargé des Avertissements -  
C. ROUSSEL -

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux -  
J. BRUNETEAU